

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

O propósito fundamental da formulação e aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos dentro de um estabelecimento de saúde é o de reduzir os riscos para a saúde da população atendida. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

Os frascos de medicamentos vencidos, contaminados ou não utilizados, classificados como resíduos especiais, não devem ser dispostos no solo, incinerados e, tampouco, esterilizados.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

O propósito fundamental da formulação e aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos dentro de um estabelecimento de saúde é o de reduzir os riscos para a saúde da população atendida. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

A escassez de conhecimentos específicos e a falta de normas ou leis sobre o assunto são problemas característicos do gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS).

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

O propósito fundamental da formulação e aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos dentro de um estabelecimento de saúde é o de reduzir os riscos para a saúde da população atendida. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

Com o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, é possível minimizar, mas não impedir, os efeitos adversos desses resíduos sobre o meio ambiente.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

O propósito fundamental da formulação e aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos dentro de um estabelecimento de saúde é o de reduzir os riscos para a saúde da população atendida. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

Nos hospitais, o gerenciamento de RSSS deve ser avaliado e acompanhado pela comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH).

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

No que se refere ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) no Brasil, julgue o item subsequente de acordo com a legislação nacional vigente.

O transporte interno de RSS deve ocorrer imediatamente após o seu acondicionamento e poderá ser realizado em períodos de visita ou de intensa atividade.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

No que se refere ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) no Brasil, julgue o item subsecutivo de acordo com a legislação nacional vigente.

Para descarte apropriado, os materiais que contenham sangue, como bolsas transfusionais, equipos e sobras de amostras de laboratório, devem ser acondicionados em sacos de cor vermelha.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

No que se refere ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) no Brasil, julgue o item subsecutivo de acordo com a legislação nacional vigente.

Os sistemas para tratamento de RSS deverão operar sob licenciamento ambiental e estarão sujeitos a fiscalização por órgãos de meio ambiente.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TRT - 8ª REGIÃO

Com relação às práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar e ao controle de infecção hospitalar, assinale a opção correta.

- A. Equipamentos de proteção individual devem ser usados durante procedimentos invasivos. No caso de procedimentos não invasivos, somente é recomendada a utilização desses equipamentos quando há exposição a sangue e secreções.
- B. Capotes de barreira, aventais e máscaras devem ser utilizados no momento do procedimento clínico e, após retirados e guardados em lugar limpo e seco, podem ser reutilizados.
- C. As diretrizes para precaução-padrão baseiam-se nas informações sobre padrões de doenças infecciosas, modalidades de transmissão e intervenções de práticas seguras.
- D. A utilização de luvas descartáveis, pelos profissionais de saúde em exercício nos ambientes hospitalares, tem substituído gradativamente a exigência de higienização das mãos.
- E. O termo precauções-padrão refere-se a um sistema destinado a reduzir o risco na transmissão de microrganismos a partir de fontes de infecção não reconhecidas e externas à instituição de saúde.

Ano: 2017 **Banca:** CESPE **Orgão:** TRE/BA

Sabendo-se que as infecções do sítio cirúrgico (ISC) estão relacionadas a procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes internados ou ambulatoriais, com ou sem colocação de implantes, é correto afirmar que as infecções do sítio cirúrgico incisionais superficiais ocorrem:

- A. até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de implantes, e acometem qualquer órgão ou cavidade que tenham sido abertos ou manipulados durante a cirurgia.
- B. até sessenta dias após o procedimento cirúrgico e acometem tecidos moles profundos à incisão.
- C. até sessenta dias após a cirurgia e acometem apenas pele e tecido subcutâneo.
- D. até trinta dias após o procedimento cirúrgico e acometem apenas pele e tecido subcutâneo.
- E. até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de implantes, e acometem tecidos moles profundos à incisão.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Julgue o item subsequente acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

A quantidade de microrganismos necessária para provocar uma infecção hospitalar depende da virulência do organismo, da suscetibilidade do hospedeiro e do sítio afetado.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Julgue o item subsequente acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

As infecções iatrogênicas ocorrem quando o paciente internado em unidade hospitalar é submetido a procedimento diagnóstico ou terapêutico sem que sejam executados os cuidados específicos para a sua proteção.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Julgue o item subsequente acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

A UTI representa alto risco de infecção hospitalar para os pacientes, já que nela são manipulados, com frequência, antibióticos de largo espectro, que podem tornar os microrganismos resistentes, e pela ocorrência de repetidos procedimentos de saúde invasivos lá realizados.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Julgue o item subsequente acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

Uma infecção hospitalar em ferida cirúrgica pode ser causada por: inadequada preparação da pele antes da cirurgia, falha na técnica de lavagem das mãos e da troca de curativos, uso de soluções antissépticas contaminadas ou cirurgia contaminada.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Julgue o item subsequente acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

Uma infecção exógena origina-se da multiplicação rápida e da proliferação descontrolada de microrganismos existentes na flora normal dos indivíduos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 Banca: CESPE Orgão: TCE/PA

Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item a seguir.

É facultativa a lavagem de mãos durante a assistência a um único paciente entre atividades que envolvam sítios corporais

distintos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item a seguir.

A degermação das mãos da equipe cirúrgica deve incluir o uso de produtos antissépticos além de água e sabão.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item a seguir.

A comissão de controle de infecção hospitalar deve ser integrada por diferentes profissionais da área de saúde, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem de nível médio de escolaridade.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 **Banca:** CESPE **Orgão:** TCE/PA

Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item a seguir.

Infecções em recém-nascidos são consideradas hospitalares e não comunitárias, exceto as transmitidas de forma transplacentária e associadas a rotura de bolsa superior a vinte e quatro horas.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

Acerca dos aspectos relacionados ao controle e à prevenção de infecções hospitalares, julgue o item que se segue.

Para a adequada execução do programa de controle de infecções hospitalares, os hospitais devem constituir comissão de controle de infecção hospitalar, que, encarregada de assessorar a autoridade máxima da instituição e de executar as ações de controle de infecção hospitalar, deve ser composta por, no mínimo, dois técnicos de nível superior da área de saúde para cada duzentos leitos, sendo prevista carga horária diária, mínima, de seis horas para o enfermeiro.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 **Banca:** CESPE **Orgão:** MPU

Acerca dos aspectos relacionados ao controle e à prevenção de infecções hospitalares, julgue o item que se segue.

Considera-se infecção hospitalar a infecção adquirida pelo paciente internado e que se manifeste somente durante o período de internação, devendo ser comprovada a existência de relação direta entre o processo infeccioso e a internação ou os procedimentos hospitalares.

- A. Certo.
- B.

Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos aspectos relacionados ao controle e à prevenção de infecções hospitalares, julgue o item que se segue.

A infecção relacionada a acesso vascular periférico (IAVP) caracteriza-se pela presença, em pacientes sem diagnóstico concomitante de infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS), de sinais locais de infecção, com ou sem a presença de cordão inflamatório.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos aspectos relacionados ao controle e à prevenção de infecções hospitalares, julgue o item que se segue.

A microbiota transitória, que coloniza a pele de profissionais de saúde, pode ser adquirida durante o contato direto com superfícies próximas ao paciente, com produtos e com equipamentos contaminados.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos aspectos relacionados ao controle e à prevenção de infecções hospitalares, julgue o item que se segue.

O sabonete comum utilizado para a higienização das mãos não tem efeito antimicrobiano imediato nem é eficaz na remoção da microbiota transitória.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

A autoclave deve ser utilizada para a desinfecção de instrumentos cirúrgicos, soluções parenterais e curativos cirúrgicos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

A seleção do método para desinfetar ou esterilizar um material independe da natureza do material e do respectivo uso pretendido.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

A lavagem das mãos, o uso de luvas limpas e a limpeza do ambiente constituem exemplos de medidas de assepsia.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

É dispensável a lavagem prévia dos objetos que serão submetidos à desinfecção.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

A eliminação de esporos bacterianos presentes em artigos de vidro é feita com água fervendo.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2010 Banca: CESPE Orgão: MPU

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue o item a seguir.

Para esterilizar artigos de borracha, devem ser utilizadas radiações ionizantes.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: STJ

Julgue o item a seguir, acerca de classificação e processamento de artigos utilizados nos serviços de saúde.

Máscaras para inaloterapia são consideradas artigos semicríticos e não devem ser submetidas à esterilização por imersão química no formaldeído.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: STJ

Julgue o item a seguir, acerca de classificação e processamento de artigos utilizados nos serviços de saúde.

Para a assepsia de artigos críticos com lúmen interno inferior a cinco milímetros, é suficiente a limpeza manual com uso de produtos químicos e seringas.

- A.

- Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: STJ

Julgue o item a seguir, acerca de classificação e processamento de artigos utilizados nos serviços de saúde.

Classificados como artigos semicríticos, os aparelhos de medir pressão arterial devem ser submetidos à desinfecção de médio nível.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 Banca: CESPE Orgão: TCE/PA

Julgue o item subsequente, relativo ao processamento de produtos para saúde e a centros de material e esterilização (CME).

Profissionais que atuem diretamente no processamento de produtos para saúde devem receber capacitação específica e periódica em conceitos básicos de microbiologia, entre outros temas.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 Banca: CESPE Orgão: TCE/PA

Julgue o item subsequente, relativo ao processamento de produtos para saúde e a centros de material e esterilização (CME).

As áreas destinadas ao preparo e à esterilização em CME são consideradas como setores sujos e limpos, respectivamente.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2016 Banca: CESPE Orgão: TCE/PA

Julgue o item subsequente, relativo ao processamento de produtos para saúde e a centros de material e esterilização (CME).

A diferença entre as duas classes de CME está na competência para realizar o processamento de produtos críticos para a saúde, autorizado apenas para os CME classe II.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: PETROBRAS

Julgue o item subsequente.

Sacos de acondicionamento de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde podem ser esvaziados para fins de reaproveitamento, desde que atendam à norma ABNT NBR 9191/2000.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: PM-TO

Considerando-se os requisitos de boas práticas de gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde, é correto afirmar, acerca

do manejo desses resíduos, que

- A. os resíduos devem ser separados no momento de sua coleta.
- B. o reaproveitamento dos sacos é permitido apenas para materiais do grupo D.
- C. sacos com resíduos do grupo A devem ser substituídos no máximo a cada 24 horas, mesmo sem atingir o limite de capacidade.
- D. resíduos do grupo A podem ser corretamente encontrados em sacos brancos ou vermelhos, a depender do enquadramento legal.
- E. são obrigatórias tampas para fechamento no coletor, mesmo em casos em que a substituição imediata do saco é adotada como regra.

Ano: 2024 **Banca:** CESPE **Orgão:** Prefeitura de Camaçari-BA

Os agentes biológicos que afetam o ser humano são distribuídos em classes de risco. Assinale a opção que indica quais agentes biológicos são de Classe de risco 2.

- A. Os agentes biológicos que apresentam alto risco individual e para a comunidade.
- B. Os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no ser humano adulto sadio.
- C. Os agentes biológicos que apresentam baixo risco individual e para a comunidade.
- D. Os agentes biológicos que provocam infecções no ser humano, com potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente.
- E. Os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória, e que causam doenças potencialmente letais em humanos.

Ano: 2020 **Banca:** CESPE **Orgão:** Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

Julgue os itens a seguir, acerca das boas práticas no processamento de produtos em centros de material e esterilização (CME).

- I. Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e para a carga e descarga de autoclaves, é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeáveis.
- II. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia devem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida, com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
- III. No rótulo de identificação dos produtos para saúde processados, deve conter o nome do produto, o número do lote, a data da esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização e o nome do responsável pelo preparo.
- IV. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização, com liberação da carga para utilização após leitura negativa do indicador biológico.

Estão certos apenas os itens

- A. I e II.
- B. I e III.
- C. II e IV.
- D. I, III e IV.
- E. II, III e IV.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** DATAPREV

Julgue o item subsequente.

É obrigatório o uso de máscara e de óculos durante todo o processamento de produtos para saúde e em todas as áreas do centro de material e esterilização, sendo vedada sua substituição por equipamentos como o protetor facial.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** DATAPREV

Julgue o item subsequente.

O enxágue dos produtos para saúde processados em centro de material e esterilização deve ser realizado com água de padrão de potabilidade definida em norma específica.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** DATAPREV

Julgue o item subsequente.

Em se tratando de produtos para saúde classificados como semicríticos e como não críticos, basta submetê-los ao processo de limpeza.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2022 **Banca:** CESPE **Orgão:** Prefeitura de Maringá-PR

Em relação às boas práticas para o processamento de produtos para saúde, assinale a opção correta.

- A. O centro de material esterilizado só pode processar produtos compatíveis com a sua capacidade técnica operacional e conforme a sua classificação.
- B. Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível após a limpeza.
- C. Para a esterilização de produtos de saúde, é permitido o uso de estufas.
- D. No processo de limpeza manual dos produtos para saúde, a fricção deve ser realizada com acessórios abrasivos para facilitar.
- E. As embalagens utilizadas para a desinfecção de produtos para saúde devem estar regularizadas junto à ANVISA, para uso específico nesse processo.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** PETROBRAS

Julgue o item subsequente.

Todos os centros de material e esterilização devem possuir uma sala de desinfecção química.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** PETROBRAS

Acerca da normatização relacionada à saúde do trabalhador, julgue o item a seguir.

Pneumoconioses, transtornos mentais relacionados ao trabalho e dermatoses ocupacionais são eventos que devem ser obrigatoriamente notificados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2022 **Banca:** CESPE **Orgão:** Prefeitura de Maringá-PR

Os enfermeiros, assim como todos os outros profissionais da área da saúde que oferecem assistência direta a pacientes nas diferentes unidades de saúde, estão expostos à infecção transmitida por diferentes vias de contaminação. Nesse contexto, a paramentação e a desparamentação realizadas de forma incorreta estão associados à infecção de profissionais. Em relação à

paramentação e desparamentação, assinale a opção correta, segundo a recomendação do Conselho Federal de Enfermagem.

- A. Na retirada dos equipamentos de proteção individual, é recomendada higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica apenas após a retirada das luvas.
- B. Na paramentação para a realização de procedimentos geradores de aerossóis, é recomendada a seguinte ordem dos equipamentos de proteção individual: máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial, gorro ou touca, avental ou capote e luvas.
- C. A remoção dos equipamentos de proteção individual deve ser realizada ainda no quarto, próximo à saída, ou na antessala, porém é recomendada a retirada da máscara somente após o profissional deixar o quarto do paciente e fechar a porta.
- D. Na retirada do avental ou capote, recomenda-se tocar apenas em sua parte externa para prevenir a infecção.
- E. O gorro deve ser retirado somente no final da desparamentação.

Ano: 2024 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Camaçari-BA

As medidas de prevenção e proteção da saúde do trabalhador devem considerar a hierarquia de controle de riscos, em que medidas de proteção individual envolvem

- A. a substituição de produtos, maquinaria e equipamentos por outros que ofereçam menos risco para a saúde.
- B. o uso de equipamentos de proteção individual.
- C. o controle das exposições existentes no local de trabalho por meio da instalação de dispositivos de proteção que melhorem as condições gerais dos ambientes.
- D. a eliminação dos riscos de qualquer natureza.
- E. a mudança no modo e na organização do trabalho, com adoção de práticas alternativas de trabalho.

Ano: 2020 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

A respeito do planejamento na administração e assistência de enfermagem ao paciente com tuberculose pulmonar em nível ambulatorial, assinale a opção correta.

- A. Sendo negativo o resultado da baciloscopia do escarro colhida na primeira consulta de enfermagem, fica dispensada outra coleta, devendo-se apenas orientar o paciente a voltar no serviço após seis meses.
- B. Os frascos de tuberculina a serem utilizados para eventuais testes de Mantoux devem ser descongelados no início do plantão e descartados após sua abertura, no prazo de sete dias.
- C. Durante a consulta de enfermagem, o diagnóstico de tuberculose pulmonar deve ser elaborado pelo enfermeiro, que deve registrar como resultados esperados o desfecho dos exames de escarro e o teste tuberculínico.
- D. Para diminuir o risco de transmissão, a unidade de saúde que atende esse paciente deve dispor de uma sala de espera e de uma sala de coleta de escarro, ambas fechadas e com, no mínimo, 3 m².
- E. Entre as medidas administrativas importantes a serem tomadas nesse contexto incluem-se o atendimento desse paciente em horários escalonados ao longo dos turnos e o oferecimento de máscara cirúrgica para que ele a use enquanto aguarda a consulta, não estando indicada máscara PFF2.

Ano: 2020 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

(QUESTÃO ATUALIZADA) As máscaras com filtro N95 ou PFF2 são utilizadas na assistência de pacientes em que há necessidade de precauções de contato por aerossóis. São exemplos de doenças cuja prevenção demanda o uso obrigatório dessas máscaras:

- A. a covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis e a meningite.
- B. a covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis e a rubéola.
- C. a covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis e o sarampo.
- D. a covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis e a *zika*.
- E. a covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis e a coqueluche.

Ano: 2024 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Camaçari-BA

A comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) deve

I. ser constituída por profissionais de nível superior.

II. realizar periodicamente uma revisão das normas institucionais de combate às infecções hospitalares.

III. promover atividades educativas de prevenção e controle das infecções dirigidas ao quadro de profissionais de saúde do hospital.

Assinale a opção correta.

- A. Apenas o item I está certo.
- B. Apenas o item II está certo.
- C. Apenas o item III está certo.
- D. Apenas os itens I e III estão certos.
- E. Todos os itens estão certos.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: DATAPREV

Julgue os itens subsequentes.

Por força do princípio da biossegurança, o uso de luvas pode substituir o processo de lavagem das mãos na situação de indisponibilidade de pias e lavatórios, conforme previsto nas normas regulamentadoras do trabalho.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2020 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

O Ministério da Saúde preconiza a higienização das mãos como uma medida primária no controle e na prevenção de infecções nos serviços de saúde. O profissional de enfermagem deve, necessariamente, higienizar suas mãos com preparação alcoólica

- A. sempre antes de iniciar o turno de trabalho.
- B. quando tiver resíduo nas mãos após o preparo de medicamentos.
- C. no momento que antecede a manipulação do cateter e do sistema de administração de medicamento intravenoso.
- D. após usar o banheiro.
- E. após calçar luvas de procedimento para realização de procedimentos invasivos.

Ano: 2024 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Camaçari-BA

A higienização das mãos é um componente das medidas de precauções padrão, que visa prevenir a transmissão de microrganismos nos ambientes de assistência à saúde. Acerca dessa prática, assinale a opção correta.

- A. A higienização pode ser feita com preparação alcoólica quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- B. A higienização das mãos após tocar o paciente visa proteger o paciente, evitando a transmissão de micro-organismos das mãos do profissional de saúde.
- C. A higienização das mãos deve ser realizada somente antes do contato com as áreas próximas ao paciente.
- D. A higienização das mãos é recomendada somente antes da exposição a fluidos corporais.
- E. A higienização das mãos antes da realização de qualquer procedimento asséptico evita a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente.

Ano: 2020 Banca: CESPE Orgão: Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

A higienização das mãos é uma medida de extrema importância para prevenir infecções na assistência à saúde. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A. As mãos, quando visivelmente sujas ou contaminadas, devem ser higienizadas somente com álcool em gel a 70%.
- B. A higienização antisséptica das mãos deve ser feita com polivinil pirrolidona iodo (PVPI) degermante, durante três a cinco minutos.
- C.

- O uso de luvas de procedimento torna facultativa a higienização das mãos durante a assistência.
- D. A higienização simples das mãos favorece a remoção mecânica de substâncias orgânicas e microrganismos.
- E. O uso obrigatório do álcool em gel a 70% restringe-se a procedimentos em que há possível contaminação por fluidos corporais.

Ano: 2020 **Banca:** CESPE **Orgão:** Prefeitura de Barra dos Coqueiros-SE

Assinale a opção correta acerca das medidas de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

- A. Os equipos de infusão de hemocomponentes devem ser trocados a cada 96 horas, a fim de se evitar infecção da corrente sanguínea.
- B. Na higiene íntima rotineira do paciente que usa cateter de longa permanência, é preciso aplicar antibióticos ou antissépticos junto ao meato urinário e realizar a troca periódica desse dispositivo.
- C. Para prevenir infecção cirúrgica, a tricotomia deve ser feita de rotina no dia anterior, com lâminas descartáveis.
- D. Na utilização de cateteres venosos periféricos, devem-se escolher aqueles de maior calibre, para diminuir a resistência das soluções infundidas, e manter fixação com esparadrapo comum ou fita *micropore*.
- E. Para diminuir os riscos de pneumonia associada à ventilação mecânica do paciente entubado, a higiene bucal dele deve ser feita com gaze seca ou umedecida em água destilada, inclusive na superfície externa do tubo orotraqueal.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** DATAPREV

Julgue o item que se segue, com base em referências reconhecidas pelo Ministério da Saúde para o trabalho em enfermagem.

A infecção adquirida fora do ambiente hospitalar é denominada infecção externa.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 **Banca:** CESPE **Orgão:** EBSEH

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

A esterilização de pós e pomadas deve ser feita em estufas e em vapor saturado sob pressão (autoclaves).

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 **Banca:** CESPE **Orgão:** EBSEH

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

O processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é o mais utilizado em hospitais e o mais econômico para a esterilização de artigos termorresistentes.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 **Banca:** CESPE **Orgão:** EBSEH

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

A limpeza prévia dos produtos médico-hospitalares deve ser rigorosa para garantir a eficácia da esterilização, independentemente do material e do método de esterilização.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

Com relação aos requisitos mínimos necessários às boas práticas no processamento de produtos para a saúde, a fim de garantir a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, julgue o item a seguir.

A desinfecção de nível intermediário compreende o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos patogênicos na forma vegetativa, inclusive micobactérias e fungos, de objetos inanimados e superfícies, e artigos semicríticos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

Com relação aos requisitos mínimos necessários às boas práticas no processamento de produtos para a saúde, a fim de garantir a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, julgue o item a seguir.

Na desinfecção química, o CME deve realizar a monitorização dos indicadores de efetividade dos desinfetantes utilizados em artigos semicríticos, como concentração e pH, no mínimo uma vez ao dia, antes do início das atividades.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

Com relação aos requisitos mínimos necessários às boas práticas no processamento de produtos para a saúde, a fim de garantir a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, julgue o item a seguir.

O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência, desde que seja monitorado por integrador ou emulador químico e que os produtos para saúde sejam utilizados imediatamente após a execução do processo.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 **Banca:** CESPE **Orgão:** PETROBRAS

Considerando o disposto na legislação e os aspectos da regulação em saúde e em enfermagem no Brasil com impactos na realidade profissional, julgue o item a seguir.

A fricção para limpeza manual de materiais de saúde deve ser feita com acessórios abrasivos que liberem partículas removedoras.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 **Banca:** CESPE **Orgão:** EBSERH

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Durante a higienização das mãos, é importante que o visitante mantenha adornos como anéis e alianças nos dedos, para garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de contaminantes após o contato com a água ou com o álcool.

- A.

- Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

A fonte endógena, como a microbiota presente na flora da boca e na pele do paciente, é fator associado à etiologia de infecções hospitalares.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Em ambiente hospitalar, o uso de solução alcoólica para a higienização das mãos (álcool em gel) pode substituir o uso de lavatórios ou pias com água corrente em dias de racionamento no fornecimento de água público.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Apesar de altamente relevante, a existência de comissão de controle de infecção hospitalar em serviços de saúde é facultativa.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

O programa de controle de infecção hospitalar compreende um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo possível a incidência de infecções hospitalares.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Embora a higienização das mãos seja, comprovadamente, a medida mais importante em prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, a adesão dos profissionais a essa medida ainda é insuficiente. A respeito desse tema e de aspectos diversos a ele relacionados, julgue o item a seguir.

A higienização das mãos com preparação alcoólica é indicada antes e após o contato com o paciente.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSE

Embora a higienização das mãos seja, comprovadamente, a medida mais importante em prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, a adesão dos profissionais a essa medida ainda é insuficiente. A respeito desse tema e de aspectos diversos a ele relacionados, julgue o item a seguir.

Dos antissépticos utilizados para a higienização das mãos, o álcool 70% é o que apresenta mais rápida velocidade de ação, mas ele é pouco eficaz contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, micobactérias, vírus e fungos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

No que diz respeito às normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de biossegurança e gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, julgue o item que se segue.

Como medida primária, a higienização das mãos previne a transmissão de microrganismos pelas mãos desde que sejam observados três elementos essenciais: agente tópico com eficácia antimicrobiana; técnica adequada e no tempo preconizado; e adesão regular no seu uso nos momentos indicados.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

No que diz respeito às normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de biossegurança e gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, julgue o item que se segue.

As precauções-padrão (PP) devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, com estado infeccioso presumível ou confirmado, e, também, na manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou suspeitos de contaminação.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

No que diz respeito às normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de biossegurança e gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, julgue o item que se segue.

Além da higienização das mãos, o uso de máscara cirúrgica tanto pelo paciente quanto pelo profissional é medida de precaução para prevenir a transmissão de microrganismos por gotículas por meio de tosse, espirro ou fala, tais como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e rubéola.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 **Banca:** CESPE **Orgão:** DEPEN

No que diz respeito às normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de biossegurança e gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, julgue o item que se segue.

Os resíduos que apresentam potencial para risco de infecção, com presença de agentes biológicos (grupo A), devem ser acondicionados em saco branco leitoso.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: DEPEN

No que diz respeito às normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca de biossegurança e gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, julgue o item que se segue.

Para a prevenção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, a instituição deve manter um programa de educação continuada para os trabalhadores que contemple, entre outros, o ciclo de vida dos materiais, biossegurança e uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: PETROBRAS

Julgue o item subsequente, com referência a aspectos práticos do trabalho em saúde e em enfermagem.

O uso correto de equipamentos de proteção coletiva (EPC) por profissionais de saúde contribui para a prevenção da infecção hospitalar.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSEH

Acerca das práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue o próximo item.

As precauções básicas compreendem equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual - apetrechos que têm o objetivo de proteger a integridade física dos trabalhadores e pacientes.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2018 Banca: CESPE Orgão: EBSEH

Acerca das práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue o próximo item.

As precauções universais, atualmente denominadas precauções básicas, são medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: COREN-SE

Em relação às medidas de prevenção de infecção em cateter central de inserção periférica (PICC), assinale a opção correta.

- A. Após a cicatrização do óstio, que dura em média duas semanas, deve-se manter o sítio de inserção descoberto.
- B. A degermação e a antisepsia com gluconato de clorexidina devem ser feitas rotineiramente para a manutenção do cateter, o qual deverá ser substituído após cinco dias de uso.
- C. Devido ao risco elevado de infecção, o PICC não deve ser utilizado em pacientes neonatais e pediátricos.
- D. Para a inserção, é necessária a adoção de precauções de barreira máxima, que incluem uso de gorro, máscara, luvas estéreis, avental estéril e campo ampliado estéril.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: SESA-AL

A Fiocruz, o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicaram os protocolos básicos

de segurança do paciente, que visam orientar profissionais na ampliação da segurança do paciente nos serviços de saúde. Com base nesses protocolos, julgue o item subsequente.

Antes da incisão cirúrgica (pausa cirúrgica), a equipe de enfermagem deve verificar e avaliar as condições de esterilização, os equipamentos e a infraestrutura, de forma a garantir a segurança do paciente e da equipe.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: SESAU-AL

A Fiocruz, o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente, que visam orientar profissionais na ampliação da segurança do paciente nos serviços de saúde. Com base nesses protocolos, julgue o item subsequente.

Medicamentos com nomes semelhantes devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia, podendo ser utilizadas letras maiúsculas ou em negrito, como, por exemplo, DOPamina e DOButamina; ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2021 Banca: CESPE Orgão: SESAU-AL

A Fiocruz, o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente, que visam orientar profissionais na ampliação da segurança do paciente nos serviços de saúde. Com base nesses protocolos, julgue o item subsequente.

Higiene das mãos é um termo geral que se refere a qualquer ação de limpeza das mãos para prevenir a transmissão de microrganismos; a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica consiste no ato de higienizar as mãos com água e sabão associado a agente antisséptico (preparação alcoólica).

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Quanto às esterilizações de materiais utilizados em casos de pacientes cirúrgicos e acerca dos procedimentos seguros ou autorizados sobre essa prática, julgue os itens a seguir.

- I. Se os pacotes de materiais esterilizados na autoclave ficarem úmidos, a sua secagem pode ser feita em estufa.
- II. Os pacotes de materiais devem ocupar a totalidade da capacidade de armazenamento da autoclave, a fim de otimizar o processo.
- III. Casos de urgência ou de emergência constituem as únicas exceções ao emprego do ciclo de esterilização a vapor para o uso imediato.

Assinale a opção correta.

- A. nenhum item está certo.
- B. apenas o item I está certo.
- C. apenas o item II está certo.
- D. apenas o item III está certo.
- E. todos os itens estão certos.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Tendo em vista que os ambientes de saúde são compostos por diversos tipos de riscos, como biológicos, físicos, químicos e ergonômicos, assinale a opção que contempla corretamente ações de biossegurança em saúde.

- A. as mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas, utilizando-se água e sabonete, preparação alcoólica e antisséptico degermante; no caso da preparação alcoólica, esta é indicada quando as mãos estiverem sujas ou contaminadas com fluidos corporais.
- B. as precauções padrão (PP) devem ser seguidas exclusivamente para os pacientes hospitalizados com infecções gram-negativas, sendo recomendados os seguintes EPIs: luvas, avental, óculos e máscara.
- C. os resíduos que contenham produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente (grupo A) devem ser acondicionados em saco branco leitoso.
- D. o treinamento para todos os profissionais envolvidos nas atividades em saúde deve contemplar prática de segregação dos RSS; símbolos, expressões e padrões de cores adotadas para o gerenciamento de RSS; e formas de reduzir a geração de RSS e a reutilização de materiais.
- E. os produtos para saúde denominados semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou com mucosas íntegras colonizadas.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Assinale a opção correta no que se refere ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) com base na Resolução RDC n.º 222/2018.

- A. os sacos que acondicionam RSS podem ser reaproveitados sempre que possível.
- B. os sacos que contenham RSS infectantes ou de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas, independentemente do volume.
- C. as agulhas, no conjunto seringa-agulha utilizado na aplicação de vacinas, quando não desconectadas, devem atender às regras de manejo dos resíduos perfurocortantes.
- D. órgãos, tecidos, fluidos e todos os materiais provenientes de pacientes devem ser tratados quimicamente antes de serem encaminhados ao processamento final de incineração.
- E. as bolsas de sangue e de hemocomponentes as oriundas de coleta incompleta ou com prazo de validade vencido podem ser descartadas sem tratamento.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Conforme as orientações do Ministério da Saúde sobre questões relacionadas ao trato urinário, assinale a opção correta.

- A. a inserção de cateter urinário é essencialmente asséptica e, por isso, raramente é causa de infecção do trato urinário.
- B. no que se refere à possibilidade de infecção, é indiferente conectar de modo aberto ou fechado o sistema de drenagem à sonda de demora.
- C. saída de urina é parâmetro inadequado para avaliar a eficácia do cateter vesical de demora quando o paciente apresenta baixo débito urinário.
- D. para coletar, de forma segura, a urina de paciente com sonda vesical para a realização de exame, deve-se desconectar a junção entre a sonda e o sistema coletor e, depois da coleta, desinfetar o sistema.
- E. o cateterismo vesical de alívio provoca agressão à parede uretral e resulta em maior risco de infecção se comparado ao cateterismo de demora.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

As recomendações para a prevenção da infecção do trato urinário (ITU) incluem.

- A. realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário.
- B. manter o sistema de drenagem aberto e estéril.
- C. utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
- D. trocar o cateter urinário rotineiramente, preferencialmente a cada 21 dias.
- E. monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Considerando as principais medidas preventivas práticas para os casos de infecção da corrente sanguínea (ICS), assinale a

opção correta.

- A. a utilização da técnica de pressão negativa e pulsátil para minimizar o retorno de sangue para o lúmen do cateter é recomendada para o flushing e a manutenção do cateter periférico.
- B. com relação à higienização das mãos, estas devem ser higienizadas antes e após a inserção de cateteres e em qualquer tipo de manipulação dos dispositivos, ressaltando-se que o uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos.
- C. para atender à necessidade da terapia intravenosa, o uso de cateteres de maior calibre e menor comprimento de cânula é o recomendado; cateteres com maior calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
- D. uma recomendação de alto nível de evidência quando do preparo da pele é realizar fricção desta com solução à base de álcool, a qual contenha gluconato de clorexidina em concentração acima de 0,5% e iodopovidona ? PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%.
- E. com o propósito de proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecções, a cobertura para cateter periférico pode ou não ser estéril, desde que seja semioclusiva (gaze e fita adesiva) ou membrana transparente semipermeável.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: TJ-ES

Em relação ao risco biológico e às medidas básicas de precaução para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos casos em que for necessário iniciar a precaução por aerossóis, o profissional, entre outros cuidados, deverá utilizar máscara PFF2/N95.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Acerca dos equipamentos de proteção individual e coletiva, julgue os itens a seguir.

- I. Óculos e protetor facial são equipamentos de proteção individual.
- II. As placas sinalizadoras são equipamentos de proteção coletiva.
- III. A caixa de perfurocortante compõe os equipamentos de proteção individual.

Assinale a opção correta.

- A. apenas o item II está certo.
- B. apenas o item III está certo.
- C. apenas os itens I e II estão certos.
- D. apenas os itens I e III estão certos.
- E. todos os itens estão certos.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: TJ-ES

Em relação ao risco biológico e às medidas básicas de precaução para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

Entre as medidas preventivas de infecções associadas à assistência à saúde (IRAS), incluem-se a higienização das mãos, a utilização correta de precauções e de isolamento, a limpeza e a desinfecção de ambientes e superfícies e o uso de técnicas seguras de inserção e manutenção de dispositivos invasivos.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Considerando os cuidados necessários para prevenir diferentes formas de transmissão de doenças durante o trabalho de enfermagem, julgue os itens a seguir.

I. As luvas de procedimento devem ser utilizadas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas e devem ser calçadas imediatamente antes do contato com o paciente e descartadas após o uso.

II. Nos casos de infecções transmitidas por gotícula, quando não houver quarto privativo, o paciente poderá ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo.

III. Os profissionais que têm contato com doenças transmitidas por aerossóis devem utilizar somente os equipamentos utilizados para prevenir a transmissão por contato e por gotículas. IV. É necessário utilizar óculos, máscara e(ou) avental quando houver risco de contato com sangue e fluidos corporais, para a proteção dos olhos, nariz, roupa e superfície corporal.

Assinale a opção correta.

- A. apenas os itens I, II e III estão certos.
- B. apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C. apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D. apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E. todos os itens estão certos.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: TJ-ES

Em relação ao risco biológico e às medidas básicas de precaução para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

Em nenhuma hipótese o paciente que necessite ser colocado em precaução para aerossóis poderá compartilhar o quarto com outro paciente, mesmo que ambos estejam infectados pelo mesmo microrganismo.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2023 Banca: CESPE Orgão: TJ-ES

Em relação ao risco biológico e às medidas básicas de precaução para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

A etiqueta respiratória refere-se a um conjunto de medidas ? cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço ao tossir ou espirrar e higienizar com frequência o telefone celular, por exemplo ? que diminuem a quantidade de gotículas expelidas por meio das vias aéreas de uma pessoa, a fim de minimizar o risco de contaminação de outras pessoas.

- A. Certo.
- B. Errado.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

De acordo com a NR 32, do Ministério do Trabalho e Emprego, os agentes biológicos são classificados em classes de risco.

- A. classe de risco 1 apresenta risco individual baixo para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- B. risco individual moderado para o trabalhador, com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade.
- C. risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade.
- D. risco elevado de causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- E. risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade de disseminação para a coletividade.

Ano: 2022 Banca: CESPE Orgão: TRT - 8ª REGIÃO

Acerca da classificação e dos conceitos de classes de risco, assinale a opção correta.

- A. **Schistosoma mansoni** e o vírus da rubéola são exemplos de agentes biológicos de classe 3, ou seja, alto risco individual e moderado risco para a comunidade.
- B. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é exemplo de agente biológico de classe 4, ou seja, alto risco individual e moderado risco para a comunidade.
- C. **Bacillus anthracis** é exemplo de agente biológico de classe 4, ou seja, alto risco individual e para a comunidade.
- D. Vírus ebola e vírus da varíola são exemplos de agentes biológicos de classe 2, ou seja, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade.
- E. **Lactobacillus spp.** e **Bacillus subtilis** são exemplos de agentes biológicos de classe 1, ou seja, baixo risco individual e para a comunidade.